

# 博月盈动足底压力分析报告

检查号:

联系电话:

日期时间:

姓名:

性别:

出生年月:

身高:

体重:

临床诊断:



检查项目:

申请科室:

申请医生:

## 一、3D足底扫描

|      |   |   |
|------|---|---|
| 中国码  | 左 | 右 |
| 鞋码   |   |   |
| 足弓类型 |   |   |



|    |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
| mm | 脚掌长度 | 脚掌宽度 | 后跟宽度 | 足弓长度 |
| 左  |      |      |      |      |
| 右  |      |      |      |      |

|    |               |      |      |      |
|----|---------------|------|------|------|
| mm | 1-5跖骨<br>中心宽度 | 内侧高度 | 外侧高度 | 足弓指数 |
| 左  |               |      |      |      |
| 右  |               |      |      |      |

| 跟翻转角度(度) |    |     |    | 小腿角度(度) |    |     |    |
|----------|----|-----|----|---------|----|-----|----|
| 参考值      | 轻度 | 中度  | 重度 | 参考值     | 轻度 | 中度  | 重度 |
|          | <4 | 4~8 | >8 |         | <4 | 4~8 | >8 |
| 测量值      | 左: |     | 右: | 测量值     | 左: |     | 右: |

左

足弓指数


右

参考值 高<<(0.21~0.26) 正常>>低  
低 (+)<0.28; 低(++)<0.30; 低(+++)>0.30




## 二、压力测量鞋动态足压检测

足部压力分布图参考




足部平均压力分布



总结：

## 压力中心分析

蝶形图参考图




蝶形图：蝶形图是人在行走过程中，人体重心在地面上的投影连线所形成的轨迹。

蝶形图混乱说明行走过程中，步态稳定性较差。


蝶形图清晰说明行走过程中，步态的稳定性较好。

蝶形图轨迹重合明显说明行走过程中，步姿步态相当好。

测量结果



九区分析图



| 左脚    | 分区压力 | 百分比 | 参考标准   | 评价 | 左脚    | 分区压力 | 百分比 | 参考标准   | 评价 |
|-------|------|-----|--------|----|-------|------|-----|--------|----|
| 2-5脚趾 |      |     | 3-5%   |    | 2-5脚趾 |      |     | 3-5%   |    |
| 拇趾    |      |     | 6-8%   |    | 拇趾    |      |     | 6-8%   |    |
| 4-5跖骨 |      |     | 10-14% |    | 4-5跖骨 |      |     | 10-14% |    |
| 2-3跖骨 |      |     | 14-18% |    | 2-3跖骨 |      |     | 14-18% |    |
| 第一跖骨  |      |     | 6-8%   |    | 第一跖骨  |      |     | 6-8%   |    |
| 外侧足弓  |      |     | 10-12% |    | 外侧足弓  |      |     | 10-12% |    |
| 内侧足弓  |      |     | 2-3%   |    | 内侧足弓  |      |     | 2-3%   |    |
| 外侧足跟  |      |     | 15-18% |    | 外侧足跟  |      |     | 15-18% |    |
| 内侧足跟  |      |     | 15-18% |    | 内侧足跟  |      |     | 15-18% |    |

仅供临床参考